



## Brut- und Impftermine des GZV Celle 2022

Brut- und Impfplan Marek/Kokzidien						
		Jan-Küken	Feb-Küken	Mrz-Küken	Apr-Küken	
Bruteier einlegen		09.01.2022	06.02.2022	06.03.2022	03.04.2022	
Küken schlüpfen		31.01.2022	28.02.2022	28.03.2022	25.04.2022	
Marek /Kokzidien		02.02.2022	02.03.2022	30.03.2022	27.04.2022	
Impfplan Newcastle (Schluckimpfung Trinkwasser/Jahresimpfung mit Spritze)						
Termin	Zeit	Alttiere	Jan-Küken	Feb-Küken	Mrz-Küken	Apr-Küken
16.01.2022	8:00 Uhr	X				
27.02.2022	8:00 Uhr		X			
27.03.2022	8:00 Uhr		X	X		
24.04.2022	8:00 Uhr	X	X	X	X	
29.05.2022	8:00 Uhr			X	X	X
26.06.2022	8:00 Uhr				X	X
31.07.2022	8:00 Uhr	X	X	X		X
27.08.2022	Anmeldung!	X	X	X	X	X
23.10.2022	8:00 Uhr	X	X	X	X	X

### Adressen Newcastle-Impfung

Gerhard Marwede  
Gardinenstr. 10  
29355 Beedenbostel  
Telefon 05145-6118

Björn Büsch c/o Zum Gemütlichen Eck  
Mittelstr. 7  
29313 Hambühren  
Handy 0176-83193839

### Adressen Marek-/Kokzidien-Impfung

Die Einlege- und Schlupf-Termine oben sind auf die Praxis in Fintel abgestimmt. Bitte die Termine entsprechend anpassen, wenn in Deersheim, Walbeck oder Hannover geimpft werden soll. Die genauen Impftermine sind online abrufbar unter den angegebenen Links:

Tierarztpraxis Fintel  
Stephan Bogdanski  
Hinter den Höfen 27  
27389 Fintel  
Telefon 04265-94164  
Mi. 19:00 Uhr (14-tägig)  
[www.tierarzt-fintel.de](http://www.tierarzt-fintel.de)  
Kosten: ca. 1,20 €/Küken

Tierarztpraxis & Labor  
Dr. Karin Böhland  
Im Winkel 3  
38835 Deersheim  
Telefon 039421 72523  
Di. & Fr. 15:00-17:00 Uhr  
[www.labor-boehland.de](http://www.labor-boehland.de)  
Kosten: ca. 1,30 €/Küken

Tierarztpraxis  
Toni Ferchland  
Bergstr. 18  
39356 Walbeck  
Telefon 039061-986467  
Sa., 10:00 Uhr (Feb.-Mai)  
[www.tierarztpraxis-ferchland.de](http://www.tierarztpraxis-ferchland.de)  
Kosten: k.A.

Weitere Alternative: TiHo Hannover, Klinik für Geflügel, Bünteweg 17, 30559 Hannover, Telefon 0511 953-8778, Wechselnde Termine, [www.tiho-hannover.de](http://www.tiho-hannover.de), Kosten: ca. 1,50 €/Küken

## Wichtige Hinweise zu den Impfungen

### Marek-Impfung

Der Impfstoff gegen Marek wird gespritzt. Dies muss in den ersten 72 Stunden nach dem Schlupf geschehen (sog. Eintagsküken). Eine spätere Impfung gegen Marek ist nicht möglich!

### Kokzidien-Impfung

Die Impfung gegen Kokzidien ist eine Schluckimpfung, die allerdings erst langfristig wirkt. Sie muss auch in den ersten Lebensstagen gegeben werden. Um den vollen Impfschutz zu erlangen, müssen die Küken in den ersten drei Wochen immer wieder Kot der anderen Küken aufnehmen. Erst durch diese ständige Neuinfektion entwickeln die Küken genügend Antikörper.

Es gibt acht verschiedene Stämme an Kokzidien. Es ist deshalb wichtig, dass ein Impfstoff verabreicht wird, der gegen alle Stämme wirksam ist. Es gibt auch Impfstoffe, die nur gegen einen Teil der Kokzidien-Stämme wirken.

Tiere, die gegen Kokzidien geimpft wurden, dürfen kein Küken- oder Hühnerfutter mit Kokzidiostatika erhalten! Solches Futter ist speziell gekennzeichnet. Also Finger weg von Futter mit Cocc oder Cocci (von Coccidiostatikum).

### Newcastle-Impfung

Die Newcastle-Impfung ist die einzige gesetzliche Pflichtimpfung bei Hühnern. Es gibt verschiedene Impfstoffe, die entweder über das Trinkwasser verabreicht oder in den Muskel gespritzt werden. Die Schluckimpfung muss bei Alttieren vierteljährlich wiederholt werden, bei Küken monatlich zur Grundimmunisierung. Die Impfung per Spritze muss nur einmal jährlich aufgefrischt werden. Alttiere können also entweder alle drei Monate die Schluckimpfung bekommen oder einmal jährlich per Spritze geimpft werden.

Küken brauchen auf jeden Fall eine Grundimmunisierung über das Trinkwasser.

Schluckimpfung über das Trinkwasser: Es werden an den Terminen in schwarzer Schrift jeweils um 8:00 Uhr 1ml Impfstoff pro Huhn abgegeben. Für den Impfstoff reicht ein kleines verschließbares Gefäß (*Bitte mitbringen*). Der Impfstoff sollte insbesondere im Sommer kühl transportiert werden z.B. in einer Styroporbox mit Kühlpad. Er muss von den Hühnern bis 10:00 Uhr aufgenommen worden sein. Die Menge des Trinkwassers, in dem der Impfstoff aufgelöst wird, sollte so bemessen werden, dass die Hühner es in circa einer Stunde austrinken.

Damit die Tiere ausreichend durstig sind, hat es sich bewährt, ihnen am Abend vorher das Trinkwasser zu entziehen.

Nadelimpfung: Für die Nadelimpfung ist eine Anmeldung bei Gerhard Marwede notwendig. Bei großen Beständen kommt das Impfteam in die Zuchtanlage, bei kleinen Beständen müssen die Tiere zu einem verabredeten Ort gebracht werden.